



广西水稻 台风洪涝灾后恢复生产技术 指导手册

广西壮族自治区农业科学院
2026 年 7 月

广西水稻台风洪涝灾害后恢复生产技术

针对广西水稻在台风过境后常见的倒伏、涝渍及病虫害高发等问题，结合灾后恢复的关键时间节点，提出一套“先排水洗苗、再分类扶正、后补肥防病、抢时改种”的实操技术流程，供广大种植户和基层农技人员参考使用。

1.抢排积水与清洗叶面

台风暴雨过后，田间积水是最大的次生危害，务必第一时间处理。洪水退后立即疏通被堵塞的田边沟渠排水，高温晴天要分次排水，保留3-5厘米浅水层，防止曝晒失水，阴雨天则可一次性排干；排水过程中，若稻叶上沾有大量泥浆，可人工喷水轻轻冲洗。

2.分类处理倒伏水稻

倒伏后时间越长，茎秆恢复越难，请抓紧在灾后2-3天内处理。轻微倒伏的水稻可自行恢复，无需人工扶起；严重倒伏的水稻必须小心扶正，并将相邻的几株绑在一起相互扶持；已成熟或穗子已贴地泡水的水稻，应立即抢收。

3.科学管理

灾后水稻根系吸肥能力弱，施肥一定要“看苗说话”。处于分蘖期的水稻可亩施尿素3-5公斤；处于抽穗扬花期的水稻以叶面肥为主，喷施磷酸二氢钾和芸苔素内酯等，慎用尿素以防贪青；处于灌浆成熟期的水稻可喷施磷酸二氢钾以提高千粒重。若秧苗受淹严重、根系发黑发臭、茎基部腐烂已无保留价值的，应根据农时条件选择生育期合适的水稻品种补播补插。农时紧张来不及育秧的，可采用直播栽培作为补救措施。延迟播插的田块适当密植、以密补迟，移栽前施“送嫁肥”，喷“送嫁药”，并尽早做好田间管理工作。

4.综合防控病虫害

“大灾之后必有大疫”，台风伤口的出现和田间高温高湿环境，极易暴发细菌性病害，需要重点预防细菌性条斑病、白叶枯病、稻瘟病、

纹枯病和稻飞虱等。细菌性条斑病及白叶枯病可用噻唑锌、噻菌铜；稻瘟病可用三环唑、苯甲嘧菌酯；纹枯病可用苯甲丙环唑和景岗霉素；稻飞虱可用三氟苯嘧啶、烯啶虫胺。

5.绝收田块及时改种

绝收田块，应尽快翻耕整地，抢种补种，季节过迟，无法再种植水稻的，改种其他农作物。改种前建议先咨询当地农技站，获取适应当地气候的品种信息。

依托单位：广西壮族自治区农业科学院水稻研究所
专家及联系电话：唐茂艳 18677072216